

Полиомиелит



Полиомиелит - опасное для жизни инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусами.

Источник инфекции – больной полиомиелитом человек или носитель.

Полиомиелит преимущественно передается **фекально-орально** с загрязнённой водой и продуктами питания, реже **воздушно-капельным путем** - при кашле, чихании, разговоре.

Полиомиелитом можно заболеть в любом возрасте, но наиболее подвержены заражению дети:

- не привитые против полиомиелита,
- получившие менее 3-х прививок против полиомиелита,
- привитые с нарушением сроков вакцинации.

Около 30% случаев полиомиелита заканчиваются стойкими остаточными параличами с атрофией мышц, приводящими к инвалидизации.



Симптомы полиомиелита зависят от формы инфекции:

- **Абортивная форма (малая болезнь)**
лихорадка, слабость, ринит, головная боль, тошнота и рвота, диарея
- **Менингеальная форма**
лихорадка, сильная головная боль, рвота, боли в спине, шее, конечностях
- **Паралитическая форма**
лихорадка, слабость, ринит, головная боль, рвота, диарея, парезы и параличи мышц тела и конечностей, контрактуры и деформации суставов

Осложнения полиомиелита: ателектазы легких, пневмония, желудочно-кишечные расстройства, парез кишечника и мочевого пузыря.

Больной может погибнуть от дыхательной недостаточности, вызванной параличом дыхательных мышц.

Самая надежная защита от полиомиелита – вакцинация!

Схема иммунизации:

V1 – 3 месяца	RV1 - в 18 месяцев
V2 - 4.5 месяца	RV2 - в 20 месяцев
V3 - 6 месяцев	RV3 - в 6 лет

Три вакцинации и первая ревакцинация проводятся инактивированной вакциной, а последующие ревакцинации – живой.